

RAVIMID

Toode	Toimeaine	Lapsed	Täiskasvanud Ravimi
Esomeprasool tbl 20 mg (Escadra) N7	Esomeprasool		☐
Euphyllin inj 240.00 mg, N10	aminofülliin	5-6 mg/kg i/n - 2 mcg/kg i/v - 1 mcg/kg i/n - 2 mcg/kg i/v - 1 mcg/kg	
Fentanyl inj 50mkg/ml 2ml, N1	fentanüül		
Fentanyl inj 50mkg/ml 5ml, N1	fentanüül		
Fenütoiin inj, N1	fenütoiin	5 mg/kg, mitte kiirem kui 1 mg/kg/min, kokku 15- 20mg/kg	250-500mg, 50mg/min, 15- 20 mg/kg ☐
Flumazenil inj 0,5mg/5ml N1	flumaseeniil		☐
Furosemiid inj 20 mg, N10	furosemiid	1-2 mg/kg	☐
Glycosa 10% 250ml N1	süsivesikud		
Haloperidol inj 5.00 mg, N5	haloperidool		☐
Haloperidoli tilgad, N1	haloperidool		☐
Ibuprofen Lannacher tbl 400mg, N100	ibuprofeen	10 mg/kg, max 2400 mg/d	☐
Isoket spray 1,25mg, N1	isosorbiitdinitraat		☐
Isoprenalina cloridato inj 0,2 mg/ml N1	isoprenaliin		☐
Ketamin Inresa inj 50mg/ml 2ml, N1	esketamiin	0,1-0,2 mg/kg i/v toime saabub 30- 60 sek jooksul ja kestab 5-15 min	0,2 mg/kg iv valuravi 0,5 mg/kg iv sedatsioon ☐
Ketonal inj 100 mg, N10	ketoprofeen	0,5 mg/kg	☐
Lidokaiin inj 100 mg, N10	lidokaiin	1 mg/kg	☐

Toode	Toimeaine	Lapsed	Täiskasvanud Ravimi
Loperamid N10	loperamiid	Seda ravimit ei tohi kasutada alla 12-aastastel lastel	Algannus on 4 mg, seejärel 2 mg pärast iga roojamist. Maksimaalne ööpäevane koguannus on 12 mg
Mabron Retard tbl 100 mg (Tramadol), N1	tramadool	ei sobi kasutamiseks alla 12-aastastel lastel	50...100 mg x2 päevas, max 200 mg
Magnesii sulfas inj 2500 mg, N10	magneesiumsulfaat	2 mg/kg	
Medsamic 100mg/ml, N10	traneksaamhape	20 mg/kg ööpäevas	0,5 g kuni 1 g aeglase i/v süstena (=1 ml/minutis) 2-3x ööpäevas
Metoclopramid inj 10.00 mg, N10	metoklopramiid	0,1-0,2 mg/kg	
Metoprolol tbl 50 mg ratiofarm, N30	metoprolool		
Microlax tube, N1	naatriumlaaurüülsulfaatsetaat +sorbitool +naatriumtsitraat		
Midazolam inj 5mg/5ml N1	Midasolaam		
Midazolam inj 5mg/ml 1ml, N1	midasolaam	0,1-0,3 mg/kg	
Morphin inj 10 mg/ml 1ml, N1	morfiin	0,2-0,5 mg/kg	
Nexodal inj 0,4 mg, N1	naloksoon	5-10 mkg/kg i/v 5' jooksul	
Nifedipin-RTP gtt 20mg/ml 5.00 mg, N1	nifedipiin		
Nitrocine inj 1mg/ml, N10	glütserüültrinitraat		2...8 mg/h (33...133 mkg/min)
Nitroglycerin spray 0.40 mg, N1	glütserüültrinitraat		